

El fred extrem i la contaminació poden incrementar les crisis epilèptiques

Les temperatures molt baixes i les elevades concentracions de diòxid de nitrogen (NO [



Foto: 'Postals d'hivern' Ferran Turmo Gort (CC BY-NC-SA 2.0)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B2xid_de_nitrogen]) poden incrementar les crisis epilèptiques. Així ho determina una recerca de la Universitat de Lleida (UdL) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) que ha analitzat els factors ambientals de 4.755 admissions hospitalàries per aquesta patologia a les comarques de Ponent al llarg d'una dècada (2010-2019). Representen 0,52% de totes les visites a Urgències. Els resultats, publicats a la revista *Frontiers in Public Health* [<https://www.frontiersin.org/journals/public-health>], encoratgen a tenir en compte les variables meteorològiques, inclosos els contaminants atmosfèrics, a l'hora d'estudiar els ingressos d'emergència per convulsions. [Ampliar notícia] [<https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/El-fred-extrem-i-la-contaminacio-poden-incrementar-les-crisis>]

Text: Comunicació IRBLleida / Premsa UdL

M É S

I N F O R M A C I Ó :

N o t í c i a

I R B L l e i d a

[

<https://www.irblleida.org/ca/noticies/2014/el-fred-extrem-i-la-contaminacio-de-l-aire-poden-incrementar-les-c>]

Article *Seizures, climate and pollution: is there evidence of an association?* [

<https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2025.1708538/full>]