

Predir l'estada a l'hospital a partir dels signes vitals

El monitoratge dels signes vitals durant les primeres 24 hores d'ingrés hospitalari pot predir el temps d'estada dels pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) [



<https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/malaltia-pulmonar-obstructiva-cronica-00002>]) o insuficiència cardíaca crònica, segons una recerca amb personal de la Universitat de Lleida (UdL), l'IRBLleida i els hospitals universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria. L'estudi, publicat a la revista *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine* [<https://link.springer.com/journal/13049>], se centra en l'anàlisi de sèries temporals de la freqüència cardíaca i respiratòria, així com la saturació perifèrica d'oxigen. [Ampliar notícia] [<https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Predir-lestada-a-lhospital-a-partir-dels-signes-vitals/>]

Text: Comunicació IRBLleida / Premsa UdL

M É S

I N F O R M A C I Ó :

Article [<https://link.springer.com/article/10.1186/s13049-025-01458-4>] *Continuous vital sign monitoring for predicting hospital length of stay: a feasibility study in chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart failure patients* [<https://link.springer.com/article/10.1186/s13049-025-01458-4>]

N o t í c i a

I R B L l e i d a

[<https://www.irblleida.org/ca/noticies/2036/els-signes-vitals-de-les-primeres-hores-d-ingres-poden-anticipar-q>]